


ALL ABOUT CONDOMS

เกี่ยวกับถุงยางอนามัย



About Condoms เกี่ยวกับถุงยางอนามัย



History ประวัติศาสตร์

The prototype of condoms is spotted in prehistoric times. The use of condoms in daily lives nowadays is very commonplace, and is not something we need to be ashamed of. Now, let us briefly look at the history of condoms.

ต้นแบบของถุงยางอนามัยจะเห็นได้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ทุกวันนี้การใช้ถุงยางอนามัยในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องปกติธรรมดา และไม่ใช่สิ่งที่เราต้องรู้สึกอาย ตอนนี้ให้เราดูประวัติความเป็นมาอย่างคร่าวๆ ของถุงยางอนามัยกัน



BC 11,000

- The earliest record of condoms is a mural found in a cave in France named Grotte des Combarrelles. A male and a female are depicted having sex, where a condom seems to be used by the male.
- บันทึกรุ่นแรกที่สุดของถุงยางอนามัยคือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พบได้ในถ้ำในประเทศฝรั่งเศสชื่อ Grotte des Combarrelles เป็นภาพเพศชายและเพศหญิงที่มีเพศสัมพันธ์ซึ่งดูเหมือนว่าถุง

History ประวัติศาสตร์



17th-19th Century ศตวรรษที่ 17-19

- หนังสือ ตำราใช้สัตว์และผักถูกใช้เป็นวัสดุในการทำถุงยางอนามัยในประเทศจีนและยุคเรืองรองของเนเธอร์แลนด์
- ตลาดถุงยางอนามัยยังคงพัฒนาต่อเนื่องในช่วงศตวรรษที่ 18 มีถุงยางอนามัยที่มีคุณสมบัติและขนาดแตกต่างกัน วัสดุทั่วไป ได้แก่ ฟ้าลันติน (กระเพาะปัสสาวะหรือลำไส้ที่ผ่านกระบวนการถนอมด้วยสารละลายด่างและกำมะถัน) ถุงยางอนามัยประเภทนี้จำหน่ายในบาร์ ร้านเสริมสวย ร้านขายยา ตลาดกลางแจ้งและโรงภาพยนตร์ในยุโรปและรัสเซีย ต่อมาการใช้ถุงยางอนามัยถูกแพร่ไปยังสหรัฐอเมริกา แต่ใช้เฉพาะผู้มีรายได้ระดับกลางและระดับสูงเท่านั้น

- Leather, animal intestines, and fabrics are used as materials to make condoms in China and Enlightenment Netherland.
- The market for condoms continued to develop during the 18th century. Condoms of different qualities and sizes were available. Common materials were chemically treated linens, animal organs (bladder or intestines treated by alkaline solutions and sulphur). Condoms of these types were sold in bars, salons, pharmacies, open-air markets, and theatres in Europe and Russia. Later, condom use was spread to the US, but only used by middle and upper class, as people of the lower classes might lack sex education or money for condoms.

History ประวัติศาสตร์



17th-19th Century ศตวรรษที่ 17-19

- During WWI, 380000 US soldiers were infected by STIs due to the lack of condom use.
- The US government allowed general practitioners to provide condoms to citizens in the name of "disease prevention".
- The US government and some European countries started allowing the advertising of condoms. At the same time, condom started spreading in Europe.
- Latex condoms, which is thinner, safer, and has a longer shelf life, started to be popularised.
- ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ทหารสหรัฐจำนวน 38,000 คนติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนื่องจากขาดการใช้ถุงยางอนามัย
- รัฐบาลสหรัฐ อนุญาตให้แพทย์รักษาโรคทั่วไปแจกถุงยางอนามัยแก่ประชาชนภายใต้ชื่อ "การป้องกันโรค"
- รัฐบาลสหรัฐและบางประเทศในยุโรปเริ่มให้โฆษณาถุงยางอนามัย ในเวลาเดียวกัน ถุงยางอนามัยเริ่มแพร่หลายในยุโรป
- ถุงยางอนามัยลาเท็กซ์ซึ่งมีขนาดบางกว่า ปลอดภัยกว่าและมีอายุการเก็บรักษานานกว่าเริ่มเป็นที่นิยม



1990s-2000s

1990s

- The invention of polyurethane condoms brought good news for people who are allergic to latex. Its elasticity is two times of that of latex, and it allows for making condoms that are thinner.

2002

- Condoms were added into WHO Model List of Essential Medicines. The list includes the most effective and safest basic and essential medicines.

1990s

- การประดิษฐ์ถุงยางอนามัยโพลียูรีเทนนำข่าวดีมาให้กับผู้แพ้ยางลาเท็กซ์ มันมีความยืดหยุ่นสองเท่าของยางลาเท็กซ์ และช่วยทำให้ถุงยางอนามัยมีความบางกว่า

2002

- ถุงยางอนามัยถูกเพิ่มเข้าไปในต้นแบบรายการยาที่เป็นของ WHO รายการดังกล่าวประกอบด้วยยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดและมีความสำคัญ

Condom Anecdotes

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับถุงยางอนามัย

1

- The earliest male condoms only covered the tip of the penis.
- ถุงยางอนามัยชายยุคแรกๆ คลุมเฉพาะส่วนปลายของอวัยวะเพศชายเท่านั้น

2

- American soldiers used to use condoms to cover their gun barrel to prevent sand from entering the barrel, which might affect the firing of the gun.
- ทหารอเมริกันเคยใช้ถุงยางอนามัยเพื่อปิดกระบอกปืนเพื่อป้องกันไม่ให้ทรายเข้าลำกล้องปืนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการยิงปืน

3


- Drug smugglers filled up condoms with illegal drugs and swallowed them to get through immigration.
- พวกค้ายาเสพติดบรรจุถุงยางอนามัยด้วยยาเสพติดที่ผิดกฎหมายและกลืนเข้าไปเพื่อให้ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง

4

- 150,000 condoms were distributed during the 2012 London Olympics, meaning that within the 17-day period of the games, each person received 15 condoms.
- ถุงยางอนามัยจำนวน 150,000 ชิ้นถูกแจกจ่ายในช่วงโอลิมปิกลอนดอน 2012 ซึ่งหมายความว่าภายในระยะเวลา 17 วันของการแข่งขันแต่ละคนได้รับถุงยางอนามัย 15 ชิ้น

5

- Prince William and Kate Middleton are the spokespersons of Crown Jewel's Condoms of Distinction, the commemorative condoms of the Royal Wedding.
- เจ้าชายวิลเลียมและเคท มิดเดิลตันเป็นโฆษกถุงยางอนามัยของ Crown Jewel's Condoms of Distinction ซึ่งเป็นถุงยางอนามัยที่ระลึกถึงงานแต่งงานของวอนอกิเชกสมรส



Types of Condoms ประเภทของถุงยางอนามัย

We are no stranger to using condoms. But how much do you know about the material, type, and style of condom?
Let's read a little more about them!

เราไม่ใช่คนแปลกหน้าในการใช้ถุงยางอนามัย แต่คุณรู้มากแค่ไหนเกี่ยวกับวัสดุประเภท และรูปแบบของถุงยางอนามัย? ลองอ่านเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเกี่ยวกับพวกมัน!

Materials วัสดุ



Latex ยาวลาเท็กซ์

Latex is the product of tree extracts being emulsified in air. It is effective in preventing pregnancy and transmission of STIs. However, 5-7 in every 100 people are allergic to latex. Symptoms of allergy include itching and burning sensations, shortness of breath, dizziness, and fainting fit, all of which require medical treatment.

ยาวลาเท็กซ์เป็นผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากต้นไม้ ถูกผสมเข้าด้วยอากาศในอากาศ มีประโยชน์และประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์และการแพร่เชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม 5-7 ในทุกๆ 100 คนมีอาการแพ้ น้ำยาง อาการของการแพ้ ได้แก่ อาการคันและรู้สึกแสบร้อน หายใจถี่ เวียนศีรษะและอาการเป็นลม ซึ่งทุกคนต้องได้รับการรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ



Polyurethane โพลียูรีเทน

Polyurethane contains carbamate. It is used in the production of foam and plastic sponges, medical appliances and supplies, and condoms (usually the extra thin ones).

Polyurethane condoms can also effectively prevent pregnancy and STIs, and is a safe alternative for people who are allergic to latex.

โพลียูรีเทนประกอบด้วยคาร์บาเมท ใช้ในการผลิตฟองน้ำโฟมและพลาสติก เครื่องใช้ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลือง และถุงยางอนามัย (โดยปกติจะเป็นสิ่งที่บางมาก)

ถุงยางอนามัยโพลียูรีเทนสามารถป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับผู้แพ้ยาวลาเท็กซ์

Lambskin หนังแกะ

Lambskin condoms are made from processed and sterilised sheep casing (sheep intestines). It has phased out of use in developed countries. It can only be used to prevent pregnancy, but not the transmission of STIs or HIVs.

ถุงยางอนามัยหนังแกะทำมาจากปลอกหนังแกะที่ผ่านกระบวนการและฆ่าเชื้อแล้ว (ลำไส้เล็กแกะ) โดยทั่วไปแล้วจะเลิกใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้ว มันสามารถใช้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ได้ แต่ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือเอชไอวีได้



Types ประเภท:



Extra Thin บางพิเศษ

Some males think that with thinner condoms, they could be physically more intimate with their partner, and thus have a more pleasurable experience. However, the thickness of a condom has no relations with the effectiveness of prevention of transmission of STIs.

ผู้ชายบางคนคิดว่าด้วยถุงยางอนามัยแบบบางพิเศษ พวกเขาอาจมีความใกล้ชิดกับคู่ครองของพวกเขา และทำให้มีประสบการณ์ที่น่าพอใจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความหนาของถุงยางอนามัยไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์



Patterned มีลวดลาย

Common designs include studded, ribbed, which increase friction between penis and vagina during intercourse. Similarly, the designs has no relations with its effectiveness in prevention of transmission of STIs.

การออกแบบทั่วไปรวมถึงปุ่ม เป็นลายเส้นๆ ซึ่งเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างอวัยวะเพศและช่องคลอดในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ ในทำนองเดียวกัน การออกแบบไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์



Sensation Inducing (Warming/Cooling)

กระตุ้นให้เกิดความรู้สึก (ร้อน / เย็น)

Designed to induce increased sensation during sex. Some claim that warming sensation could make climaxing easier, and that cooling sensation can prolong the intercourse.

ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นความรู้สึกให้เพิ่มขึ้นในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ บางคนก็อ้างว่า ความรู้สึกอุ่นจะทำให้ถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นและความรู้สึกเย็นสามารถยืดระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ์ออกไปได้



Flavoured ประดู่รส

Some condoms contain flavoured powder or lubricants at the tip of the condom that are mainly used to cover up the taste of the latex or polyurethane. Flavoured condoms, when used together with lubricants, could also be used for anal sex.

ถุงยางอนามัยบางชนิดมีผงหรือสารหล่อลื่นปรุงแต่งรสที่ปลายถุงยางอนามัยซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เพื่อปกปิดรสชาติของยางลาเท็กซ์หรือโพลียูรีเทน ถุงยางอนามัยปรุงแต่งรสเมื่อใช้ร่วมกับน้ำมันหล่อลื่นยังสามารถใช้สำหรับการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักได้อีกด้วย



Extended Pleasure

ขยายเวลาแห่งความสุข

Some condoms are lubricated with containing benzocaine lubricant, a type of anesthetic, at the tips, which decrease sensitivity of the tip of the penis during sex. Decrease sensitivity increases duration of pleasure. There are little to no adverse effects caused to the body due to the low level of benzocaine used. Others are made of thicker material, so as to decrease the sensitivity of the tip of the penis and to create the extension of pleasure.

ถุงยางอนามัยบางชนิดหล่อลื่นด้วยสารหล่อลื่นที่มีเบนโซเคนผสม ซึ่งเป็นยาชาชนิดหนึ่ง ที่ปลายของมัน ซึ่งลดความอ่อนไหวของปลายอวัยวะเพศชายในระหว่างการใช้เพศสัมพันธ์ ลดความอ่อนไหวเพิ่มระยะเวลาของความสนุก กล่าวกันว่าเนื่องจากความเข้มข้นต่ำของเบนโซเคนที่ใช้ จึงแทบไม่มีหรือมีผลข้างเคียงกับร่างกายน้อยกว่าถุงยางอนามัยบางชนิดทำด้วยวัสดุที่หนากว่า เพื่อลดความอ่อนไหวของปลายอวัยวะเพศชายและช่วยขยายเวลาแห่งความสุข

Sizes ขนาด

Different sizes are made to suit penises of different sizes. Using the correct size prevent the condom from slipping or breaking.

ถุงยางอนามัยที่มีขนาดแตกต่างกันทำขึ้นเพื่ออวัยวะเพศชายที่มีขนาดต่างกัน การใช้ถุงยางอนามัยที่มีขนาดถูกต้องสามารถป้องกันไม่ให้ถุงยางอนามัยหลุดออกหรือแตกในระหว่างการใช้



Finger Condom

ถุงยางอนามัยนิ้วมือ

Can be used to increase lubrication, decrease discomfort caused by fingernails, and provide barrier from harmful substances such as germs from entering the vagina during fingering.

สามารถใช้เพื่อเพิ่มการหล่อลื่น ลดอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากเล็บและสร้างสิ่งกีดขวางจากสารที่เป็นอันตราย เช่นเชื้อโรคที่เข้าสู่ช่องคลอดระหว่างการใช้นิ้ว




Dental Dam แผ่นยางอนามัย

Thin, latex sheets used during cunnilingus or oral sex. It covers the vaginal opening or anus for a more hygienic and comfortable sex.

แผ่นยางลาเท็กซ์บางๆ ที่ใช้ระหว่างการกระตุ้นอวัยวะเพศของสตรีด้วยปากและลิ้นหรือการทำออรัล ใช้คลุมปากช่องคลอดหรือทวารหนัก เพื่อการมีเพศสัมพันธ์ที่สุขลักษณะและสบายมากขึ้น


Proper way to use male condom



Use a new, good quality and right fitting condom every time. Check the expiry date and make sure that the wrapper is not torn or ripped.



Put on the condom before the penis touches the genitals, mouth or anus. Open the wrapper using the easy-tear edges; avoid using scissors or other sharp instrument to open the wrapper.



Use the finger tip (don't use the finger nail) to carefully pinch the air out from the reservoir. This reservoir allows space for the serum during ejaculation.




Place the condom against the tip of the erect penis. Roll the condom on all the way down the shaft when the penis is fully erect.




If necessary, use water-base lubricant (KY). Oil-base lubricant (baby oil Vaseline, hand cream etc) will make the condom easy to break. After ejaculation, remove the condom immediately by grasping the bottom of the condom and withdraw.

Carefully prevent the condom from slipping off or spilling. Tie the open end in a knot to prevent spillage, wrap it in toilet paper and throw it in a garbage bin.

ประเภทของถุงยางอนามัย



ใช้ถุงยางอนามัยใหม่ที่มีคุณภาพดีและขนาดถูกต้วทุกครั้ง ตรวจสอบวันที่หมดอายุและตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าวัสดุหุ้มไม่ฉีกหรือขาด



ใส่ถุงยางอนามัยก่อนที่อวัยวะเพศจะแตะอวัยวะเพศ ปากหรือทวารหนัก แกะวัสดุหุ้มโดยใช้ขอบที่ฉีกง่าย หลีกเลี่ยงการใช้กรรไกรหรือข้อมือคมอื่น ๆ เพื่อเปิดหีบห่อ



ใช้ปลายนิ้ว (อย่าใช้นิ้ว) เพื่อไล่อากาศออกจากปลายถุงยาง ปลายถุงยางมีพื้นที่สำหรับขีปนระหว่างการเล่น



สวมถุงยางอนามัยกับปลายของอวัยวะเพศชายที่แข็งตัว ม้วนถุงยางอนามัยลงตลอดความยาวของอวัยวะเพศชายที่มีการแข็งตัวเต็มที่



ถ้าจำเป็นให้ใช้สารหล่อลื่นสูตรน้ำ (KY) สารหล่อลื่นสูตรน้ำมัน (เบบี้ออยล์ วาสลีน ครีมหาโม ฯลฯ) จะทำให้ถุงยางอนามัยแตกง่าย

หลังจากที่หุ้ม ให้เอาถุงยางอนามัยออกทันทีโดยจับที่ด้านล่างของถุงยางอนามัยและถอดออก

ระวังไม่ให้ถุงยางอนามัยฉีกหรือหลุดออก

ผูกปลายเปิดไว้เป็นปมเพื่อป้องกันการหกหรือไหลห้อยไว้ในกระถางชำระแล้วทิ้งลงในถังขยะ

What should I do if the condom broke/ slipped off by accident?

The Morning After Pill (Emergency Contraception) ยาในเช้าวันถัดมา (การคุมฉุกเฉิน)

- To be taken within 72 or 120 hours after intercourse
- Can be obtained from Maternal and Child Health Centres, Family health Service, or any gynaecologic clinics
- Better effects the earlier you take it
- Side effects of the morning after pill include headaches, nausea, fatigue, menstrual pain, stomachache, back pain, swollen feeling and pain at the breast area. Under normal circumstances, these side effects do not last over 24 hours
- There is a 1-3% failure rate even with correct usage of emergency contraception

**The morning after pill/emergency contraception is only for emergencies. It is not for persistent use. It cannot prevent the transmission of STIs. **

- ให้กินภายใน 72 หรือ 120 ชั่วโมงหลังการมีเพศสัมพันธ์
 - สามารถรับได้จากศูนย์สุขภาพแม่และเด็ก ศูนย์บริการสุขภาพครอบครัวหรือคลินิกทางนรีเวชต่างๆ
 - ยิ่งกินเร็วเท่าไรจะยิ่งได้ผลดีขึ้นเท่านั้น
 - ผลข้างเคียงของยาฉุกเฉินคือ ปวดหัว คลื่นไส้ เมื่อยล้า ปวดท้องน้อย ปวดท้อง ปวดหลัง รู้สึกบวมและปวดบริเวณหน้าอก ภายใต้อาการการฉีกขาด ผลข้างเคียงเหล่านี้จะใช้เวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง
 - มีอัตราความล้มเหลว 1-3% แม้ใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินอย่างถูกต้องก็ตาม
- ** ยาในเช้าวันถัดมา / การคุมกำเนิดฉุกเฉินให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ใช่สำหรับการใช้แบบต่อเนื่อง ไม่สามารถป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ **



15

ฉันควรทำอย่างไรถ้าถุงยางอนามัยขาดหรือลื่นออกโดย อุบัติเหตุ?

- In cases of condom breakage or being accidental slipped off, it is advised that testing should be carried out after 3 months of the incident (due to the 3-month window period of HIV antibody test, window period could be shortened by testing for HIV antigen)
- For people with multiple sex partners or have frequent sex, it is advised that testing be carried out every 3 months.

- ในกรณีที่ถุงยางอนามัยแตกหรือหลุดออกโดยบังเอิญ ขอแนะนำให้ทำการทดสอบหลังจากที่เกิดเหตุ 3 เดือน (เนื่องจากระยะเวลา 3 เดือนของการทดสอบแอนติบอดีเอชไอวี ระยะฟักตัวอาจสั้นลงโดยการตรวจหาแอนติเจนเชื้อเอชไอวี)
- สำหรับผู้ที่คู่นอนหลายคนหรือมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆ แนะนำให้ทำแบบทดสอบทุก 3 เดือน

HIV and STIs Testing การทดสอบเอชไอวีและโรค ติดต่อทางเพศสัมพันธ์



Being
Tested
HIV+



is **NOT** a
death
sentence



16

Post-Exposure Prophylaxis(PEP) ยาต้านไวรัส (PEP)



- A daily dose of anti-HIV medications
- Must be taken as soon as possible within 72 hours after condom broke/ slipped off
- Must be taken daily for 4 weeks consecutively, to lower the chance of getting infected and to ensure the effectiveness of the medications
- The side-effects can be strong but vary from person to person. Generally, it can cause diarrhoea, headaches, nausea and vomiting but these side effects usually stop once the treatment is finished.
- It should be used only in emergency situations only when other prevention measures (i.e. using condoms) fail. It cannot replace the regular use of condom.
- Currently, public hospitals in Hong Kong would prescribe PEP for non-occupational exposure, but it would be 'exceptional and should be considered only in the event of high-risk exposure to a source known to be HIV positive within 72 hours of exposure. You may prescribe PEP via a private clinic or private hospital.
- ใช้ยาต้านเอชไอวีในชีวิตประจำวัน
- ต้องกินยาโดยเร็วที่สุดภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากที่ถุงยางอนามัยแตก / หลุดออก
- ต้องกินเป็นประจำทุกวันเป็นเวลา 4 สัปดาห์ติดต่อกัน เพื่อลดโอกาสของการติดเชื้อและเพื่อให้มันได้มีประสิทธิภาพของยา
- ผลข้างเคียงอาจรุนแรงแต่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยทั่วไปอาจทำให้เกิดอาการท้องร่วง ปวดหัว คลื่นไส้และอาเจียน แต่ผลข้างเคียงเหล่านี้มักหยุดเมื่อการรักษาเสร็จสิ้น
- ควรใช้เฉพาะในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นเมื่อมาตรการป้องกันอื่น ๆ (เช่นใช้ถุงยางอนามัย) ล้มเหลว ไม่สามารถแทนที่การใช้ถุงยางอนามัยปกติได้
- ปัจจุบันโรงพยาบาลของรัฐในฮ่องกงจะจ่าย PEP สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำอาชีพเสี่ยง แต่จะจ่าย “เป็นกรณี พิเศษและควรได้รับการพิจารณาเฉพาะในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงที่จะรับเชื้อจากแหล่งที่รู้ว่าไม่มีเชื้อเอชไอวี” ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากที่สัมผัสเชื้อ คุณอาจจ่าย PEP ผ่านคลินิกเอกชนหรือโรงพยาบาลเอกชน

Epilogue : Don't Fall into Business Traps! อย่าตกเขาไปในกับดักทางธุรกิจ!

It is reported that fake condoms are available in the market. These fake condoms contain low quality silicon oil, are with no safety and quality inspection, and no effects on pregnancy and STIs prevention, they can even cause serious gynecological disease. These fake condoms are sold on online platforms and certain sex shops. Customers are advised to be cautious

Condoms are the guardian angels of sex workers. Please do not buy these low quality, harmful condoms for the sake of saving a couple of dollars, as they are ineffective in safeguarding your health, and can even be fatal. When buying condoms and lubricants, it is paramount to pay attention to its origins, date of production/expiration, and to buy from quality and trustworthy sources.

มีรายงานว่ามียางอนามัยปลอมขายอยู่ในท้องตลาด ยางอนามัยปลอมนี้มีน้ำมันซิลิโคนที่มีคุณภาพต่ำ ไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยและคุณภาพ และไม่มีผลต่อการตั้งครรภ์และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทั้งยังสามารถทำให้เกิดโรคทางนรีเวชร้ายแรง ยางอนามัยปลอมเหล่านี้จำหน่ายทางออนไลน์และร้านเซ็กช็อป บางประเภท ลูกค้าควรระมัดระวังให้ดี

ยางอนามัยเป็นทูดาผู้พิทักษ์ของคุณขายบริการทางเพศ โปรดอย่าซื้อยางอนามัยที่มีคุณภาพต่ำและมีอันตรายเพื่อประหยัดเงินเพียงสองถึงสามเหรียญ เพราะไม่เป็นผลดีในการดูแลสุขภาพของคุณและอาจถึงแก่ชีวิตก็ได้ เมื่อซื้อยางอนามัยและน้ำมันหล่อลื่น สิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจคือต้นกำเนิด วันที่ผลิต / หมดอายุและชื่อจากแหล่งที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้



The information in this booklet is for reference and educational purposes only. It should not be treated as a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. You should always seek advice from a qualified medical professional. Whilst Action for REACH OUT (AFRO) strives to keep the information contained in this booklet current and accurate, no warranty or guarantee concerning the accuracy, suitability or timeliness of information is made. AFRO is not responsible for any loss or damage resulting from the use of the information provided in this booklet.

For any enquiries or appointments, please contact AFRO 24-hour hotline 2770 1002. You can also reach us via the following:

หากต้องการสอบถามหรือนัดหมาย กรุณาติดต่อสายด่วน AFRO ตลอด 24 ชั่วโมงที่
2770 1002 นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อเราได้ทั้ง:



afro27701002



96698108



AFRO27701002



96698108

(Monday to Friday 9a.m.—10p.m.)

(วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9.00 น. ถึง 22.00 น.)

The content of this article represents the opinion of our organization only. It does not represent the position of the AIDS Trust Fund. AIDS Trust Fund is not responsible for any claims, demands or liabilities whatsoever arising from or in connection with the use of any information contained in this article or the participation of the sponsored project / programme."

เนื้อหาขอมบทความนี้แสดงถึงความคิดเห็นขององค์กรของเราเท่านั้น ไม่ได้เป็นตัวแทนของ AIDS Trust Fund ภาวะ AIDS Trust Fund ไม่รับผิดชอบต่อการ
เรียกร้อง ความต้องการหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในบทความนี้
หรือการมีส่วนร่วมของปัจเจก/โครงการที่ได้รับการสนับสนุน

This HIV/AIDS prevention part of project / programme is sponsored by the AIDS Trust Fund.

การป้องกันเอชไอวี/โรคเอดส์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ/โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก AIDS Trust Fund