

# Fiche conseils

---

Les antibiotiques de la famille des fluoroquinolones (dont la moxifloxacine) peuvent entraîner des effets secondaires, pouvant apparaître **jusqu'à 1 mois après l'arrêt du traitement**. En général, ces effets sont sans gravité et disparaissent à l'arrêt du traitement. Cependant, dans de rares cas, ces effets peuvent être graves ou irréversibles.

Il vous est donc conseillé d'interrompre le traitement et de **contacter rapidement votre médecin dès l'apparition des symptômes suivants** :

- Gonflement douloureux des tendons ou articulations
  - Douleurs et/ou faiblesse inhabituelles au niveau des bras ou des jambes
  - Palpitations ou sensations de battements du cœur irréguliers ou rapides
  - Difficultés à respirer, gonflement des jambes
  - Baisse de la vision ou apparition de tout autre trouble oculaire,
  - Rougeurs, irritations ou démangeaisons au niveau de la peau, notamment suite à une exposition au soleil ou aux rayonnements UV artificiels (lampe à bronzer, solarium, ...).
  - **L'apparition de douleurs abdominales, thoraciques ou dorsales soudaines et intenses impose de contacter le 15 ou de se rendre immédiatement au service d'urgence d'un hôpital.**
-