

Fiche conseils

- Prenez 1 comprimé par jour **à heure fixe avec un repas ou une collation.**
- **Le traitement n'est pleinement efficace qu'après 7 jours. N'interrompez pas le traitement moins de 7 jours après un rapport sexuel à risque.**

Attention, une observance imparfaite du traitement compromet son efficacité.

- La prise de la PrEP doit s'accompagner de la poursuite d'autres mesures de prévention des infections sexuellement transmissibles (**préservatifs**, etc.).
- En cas de **rapport sexuel à risque et d'observance imparfaite** du traitement, consultez **immédiatement** afin d'éventuellement entreprendre un **traitement post-exposition**.
- Vous risquez de constater l'apparition d'effets indésirables comme de légères nausées, une diarrhée, des douleurs abdominales et/ou des maux de tête. Ces symptômes disparaissent généralement en quelques semaines. Consultez votre médecin en cas de **symptômes sévères ou persistants**.
- **Ne prenez pas d'anti-inflammatoire** ou d'autre traitement sans en parler à votre médecin, du fait du risque d'interactions.
- En cas de difficulté à avaler le comprimé, délitez-le dans un peu d'eau (ou du jus d'orange ou de raisin) et prenez-le immédiatement.
- En cas de vomissement dans l'heure suivant la prise, prenez un autre comprimé. Ne prenez pas d'autre comprimé en cas de vomissement plus d'1 heure après la prise.
- Ne consommez pas de charbon actif ou de pansements gastriques moins de 2 heures avant ou après une prise de traitement.

Pour plus d'informations, **scannez les QR codes.**



La PrEP mode
d'emploi



PrEP -
Applications d'aide
à l'observance