



# TRACIAFIN PLUS®

UN PLUS POUR LA PROTECTION DE VOS CULTURES

## Composition

**Matière active :** Prothioconazole  
**Concentration :** 250 g/L  
**Famille chimique :** Triazolinthione  
**Mode d'action :** Inhibition de la biosynthèse des stérols  
**Formulation :** Concentré émulsionnable (EC)  
**AMM :** 2190882

## PRODUIT CLEF DANS LA PROTECTION FONGICIDE DE VOS CÉRÉALES

-  Large spectre d'activité
-  Nombreuses associations possibles avec d'autres fongicides car non classé CMR
-  Bonne répartition de la substance active dans la plante
-  Mise à l'abri du lessivage rapide grâce à sa systémie

## Tableau des usages


CULTURES	CIBLES/USAGES	DOSE MAX	NOMBRE D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DAR	MENTION RÉGLEMENTAIRE
Avoine, Blé dur, Blé tendre, Epeautre, Triticale, Orge	Piétin verse	0,8L/ha	1/an	-	35	ZNT 5m DVP 5m
Avoine d'hiver et de printemps	Oïdiums, Rouille couronnée	0,8L/ha	2/an	2ème application après le stade BBCH30	35	ZNT 5m DVP 5m
Blé tendre d'hiver et de printemps, Blé dur, Epeautre, Triticale	Fusarioses, Oïdiums, Rouilles, Septorioses					
Orge d'hiver et de printemps	Fusarioses, Oïdiums, Rouilles, Helminthosporiose et ramulariose, Rhynchosporiose					
Seigle d'hiver et de printemps	Rouilles, Rhynchosporiose					

Version du 09/10/2020. Annule et remplace toute version précédente. - page 1/2


Pour plus d'information, rendez-vous sur [www.sumiagro.fr](http://www.sumiagro.fr)



## SPECTRE D'ACTION SUR BLÉ



## SPECTRE D'ACTION SUR ORGE



Efficacité de 200g/ha de prothioconazole (source Arvalis – 2020) :

 Bonne  Intermédiaire  Faible

## Recommandations d'application

En fonction des zones, et des principales maladies visées, **TRACIAFIN® PLUS** s'utilise sur blé entre les stades 1 à 2 nœuds et la floraison et sur orge entre les stades 1 nœud et apparition des barbes. La dose à appliquer varie, elle, en fonction de la culture, des pressions maladies et des associations de produits faites, avec une dose pivot de 0,4L/ha. Afin d'assurer une bonne couverture des organes à protéger, utiliser un volume de bouillie adaptée à votre situation : entre 80 et 120L/ha sur feuille et 150-200L/ha sur épi. Au dessus de températures maximales de 25°C, nous recommandons un traitement tôt le matin ou tard le soir.

## Préparation de la bouillie

Verser directement le **TRACIAFIN® PLUS**, dans la cuve remplie aux deux tiers, le système d'agitation en fonctionnement. Si vous voulez ajouter un autre intrant, sauf si spécificités propres indiquées sur l'étiquette, respectez l'ordre de mélange suivant : correcteurs de dureté et anti-mousse ; les formulations WS et SG ; WG et WP ; SP ; les adjuvants de compatibilité ; SC ; SL ; EW et SE ; EC et pour finir les autres adjuvants (huiles, mouillants...).

Enfin, compléter la cuve avec le volume d'eau nécessaire.

**Les mélanges doivent être mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur.**

**Pour tout mélange, il est conseillé d'effectuer un test préalable à petite échelle.**

## Mentions légales

**TRACIAFIN® PLUS** - AMM n°2190882 - Prothioconazole 250 g/L - Concentré émulsionnable (EC) :

- SP 1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.
- SPe3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. En cas de ruissellement possible sur la parcelle traitée, prévoir un dispositif végétalisé non traité d'une largeur de 5 mètres par rapport aux points d'eau.
- SPe 3 : Pour protéger les plantes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente.

## TRACIAFIN® PLUS

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

H335 : Peut irriter les voies respiratoires.

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.



Version du 09/10/2020. Annule et remplace toute version précédente. - page 2/2

Sumi Agro France, **251 rue du Faubourg Saint Martin, 75 010 PARIS - 01.53.67.68.45**



Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>.

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**