



# CEFADROXILO ALFA

CÁPSULA

**FORMULA:**

Cada cápsula contiene:  
Cefadroxilo monohidrato equivalente a  
Cefadroxilo base ..... 500 mg  
Excipientes c.s.p. .... 1 cápsula

**ACCION TERAPEUTICA:**  
Antibiótico.

**INDICACIONES:**  
Tratamiento de la infección de huesos y articulaciones, impétigo, otitis media, faringitis bacteriana o amigdalitis, neumonía bacteriana, infección de la piel y tejidos blandos, infecciones bacterianas y como profilaxis en endocarditis bacteriana.

**CONTRAINDICACIONES:**  
Hipersensibilidad alguna de los componentes de la fórmula, antecedente de reacción alérgica a penicilinas, derivados penicilínicos, penicilamina y cefalosporinas. Antecedente de enfermedad gastrointestinal, especialmente colitis ulcerativa, enteritis regional o colitis asociada a antibióticos (colitis pseudomembranosa). Disfunción renal severa (se recomienda reducir la dosis).

**REACCIONES ADVERSAS:**  
Gastrointestinales: La administración de alimentos reduce la incidencia de náuseas sin disminuir la absorción del antibiótico. Pueden aparecer diarrea y síntomas de colitis pseudomembranosa durante el tratamiento. Las náuseas y vómitos son raros. Hipersensibilidad: Se ha observado alergia (rash, urticaria y angioedema), que normalmente disminuye tras la interrupción del tratamiento. Otras reacciones son prurito y moniliasis genitales, vaginitis y neutropenia moderada y transitoria. Otras reacciones adversas señalada con el cefadroxilo incluyen disfunción hepática incluyendo colestasis y elevaciones de las transaminasas séricas agranulocitosis, eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson y afecciones, aunque suelen ser bastante raras.

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:**  
Aminoglucósidos: La mezcla de cefalosporinas y aminoglucósidos puede resultar en una inactivación mutua. Si estos grupos de antibacterianos son administrados conjuntamente, ellos deberían ser administrados por separado al menos por una hora. Anticonceptivos, conteniendo estrógenos.

Probenecida: Disminuye la secreción renal tubular de las cefalosporinas excretadas por este mecanismo, como el cefadroxilo, incrementando y prolongando las concentraciones sanguíneas, lo que podría aumentar el riesgo de toxicidad.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**  
Sensibilidad cruzada y/o problemas relacionados: Alergia a las penicilinas, derivados penicilínicos, penicilamina y cefalosporinas. Carcinogenicidad/Mutagenicidad: No se han realizado estudios a largo plazo para evaluar el potencial de carcinogénesis y mutagénesis. Embarazo/Reproducción: Estudios en animales no han demostrado que cefadroxilo cause deterioro de la fertilidad o daños en el feto.

Lactancia materna: Se desconoce si cefadroxilo se distribuye en la leche materna, tampoco se han reportado problemas específicos. Pediatría: Estudios apropiados de la relación de la edad y los efectos de cefadroxilo no han sido desarrollados. Sin embargo, problemas específicos no han sido documentados. Geriátria: No se han documentado problemas hasta la fecha; sin embargo, los ancianos son susceptibles de disminuir su función renal a medida que avanza su edad, lo que podría requerir una adecuación de la dosis. Dental: El uso prolongado de cefadroxilo puede conducir al desarrollo de candidiasis oral.

**DOSIFICACION:**  
La dosis usual para adultos es de 500 mg cada 12 horas, sin embargo, en infecciones de la piel y tejidos blandos, y en infecciones del tracto urinario, el CEFADROXILO puede ser administrado a la dosis de 1 g, una vez al día (Cada 24 horas).  
Niños: La mitad de la dosis del adulto.  
El tratamiento debe continuarse por un mínimo de 48 a 72 horas después de que el paciente se vuelve asintomático o de que se haya obtenido evidencia de la erradicación bacteriana.

**VIA DE ADMINISTRACION:**  
Oral.

**MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE INTOXICACION O SOBREDOSIFICACION:**  
En caso de sobredosificación se recomienda la vigilancia del paciente a nivel hospitalario, instaurar medidas generales y realizar exámenes de laboratorio (biometría hemática, examen general de orina, transaminasas hepáticas, química sanguínea). En caso necesario puede colocarse venoclisis y a juicio del médico realizarse hemodiálisis o diálisis peritoneal.

**PRESENTACION:**  
Caja conteniendo 10, 50, 100 y 1000 Cápsulas

Venta bajo prescripción médica.  
Mantener fuera del alcance de los niños.  
Conservar en lugar fresco y seco, entre 25-30°C.



Fabricado por:  
**Laboratorios ALFA, SRL**  
República Dominicana  
www.laboratoriosalfa.com  
Reg. Industrial: 13880