



ASPIREN®

COMPOSICION:

Acido Acetilsalicilico.....81 mg
Excipientes, c.s.p.....1 tableta

ACCION FARMACOLOGICA:

El ácido acetilsalicílico es un inhibidor irreversible de la ciclooxigenasa. La inhibición de esta enzima en las plaquetas reduce la síntesis de tromboxano A2, compuesto vasoconstrictor y agregante plaquetario, de donde deriva la acción o el efecto antiagregante plaquetario de **ASPIREN**.

INDICACIONES:

ASPIREN está indicado para reducir el riesgo de infarto del miocardio, en pacientes con historia de infarto previo o para reducir el riesgo de ataques de isquemia cerebral transitoria. También está indicado en pacientes que utilicen la aspirina como analgésico.

CONTRAINDICACIONES:

Está contraindicado en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico y en pacientes con úlcera péptica, gastritis aguda o crónica. Se puede presentar interacción medicamentosa con los anticoagulantes, corticosteroides, antirreumáticos, furosemida y fármacos antigota.

EFFECTOS SECUNDARIOS:

ASPIREN generalmente es bien tolerado, sin embargo se pueden presentar molestias en el tracto digestivo.

DOSIS Y ADMINISTRACION:

La administración es oral.

ASPIREN como antiagregante plaquetario:
1 a 2 tabletas por día.

ASPIREN como analgésico: Adultos y niños mayores de 12 años: No exceder de 500 mg a 1000 mg por día. Es necesario que consulte con su médico, para establecer la dosis en cada caso, no se debe automedicar.

PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños.
Conservar en un lugar fresco y seco entre 25 - 30°C.

PRESENTACIONES:

ASPIREN: Frascos por 30 tabletas.

ASPIREN: Frascos por 60 tabletas.

ASPIREN: Cajas por 100 tabletas.

REG. SANITARIO:
Rep. Dominicana: 2004-1895

Actualizado: ENE/2015
NM/PE



Fabricado por:
Laboratorios ALFA, SRL
República Dominicana
www.laboratoriosalfa.com
Reg. Industrial: 13880