



AVANTAR-ULTRA®

LOSARTÁN + AMLODIPINA
+ HIDROCLOROTIAZIDA **100/10/25**

COMPRIMIDO

FORMULA:

Cada comprimido contiene:

Losartan Potásico.....100 mg
Amlodipina besilato equivalente a Amlodipina...10 mg
Hidroclorotiazida.....25 mg
Excipientes, c.s.p.....1 comprimido

ACCION TERAPEUTICA:

Antihipertensivo.

INDICACIONES:

Esta indicado en el tratamiento de la hipertensión arterial moderada a severa, insuficiencia cardiaca, y en todo caso donde la monoterapia no es suficiente para el control de la hipertensión arterial.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad conocida al Losartán, Amlodipina e Hidroclorotiazida. Enfermos con anuria o con hipersensibilidad a los fármacos derivados de las sulfamidas. Embarazo y Lactantes. Niños.

REACCIONES ADVERSAS:

Los efectos adversos más comunes son: edema periférico, hipotensión ortostática, cefalea, vertigo, fatiga, náuseas, vómitos, edema facial, malestar gástrico, palpitaciones, sensación de pérdida del equilibrio. El uso de Diuréticos puede producir Hipocaliemia (dolores o calambres musculares, sed, náuseas y vómitos, confusión mental), anorexia fotosensibilidad y diarrea.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

El Litio usado simultáneamente con Amlodipina puede potencializar su neurotoxicidad, bajo la forma de náuseas, vómitos, diarrea y temblor.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

En pacientes deplecionados de sodio o de volumen intravascular pueden presentarse hipotensión excesiva, por lo que estas condiciones deben ser corregidas antes de comenzar el tratamiento. No está recomendado en el tratamiento de pacientes con trastornos de la función hepática, dado que en estos pacientes resulta difícil la titulación de la dosis de losartán, amlodipina y los diuréticos tiazídicos se deben usar con precaución, pues las alteraciones aún leves del balance hidrosalino, puede precipitar el coma hepático.

DOSIFICACION:

La dosis debe ser adecuada por el médico a cada paciente en particular.

La dosis usual inicial y de mantenimiento, es de un comprimido una vez por día.

VIA DE ADMINISTRACION:

Oral

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE INTOXICACION O SOBREDOSIFICACION:

Las manifestaciones más probables de la sobredosificación serían hipotensión y taquicardia; podría ocurrir bradicardia por estimulación parasimpática (vagal) la pérdida de electrolitos (hipopotasemia, hipocloremia, hiponatremia) y a la deshidratación resultante de la diuresis excesiva.

No hay información específica sobre el tratamiento de la sobredosificación de losartán potásico, hidroclorotiazida y Amlodipina. El tratamiento es sintomático y de sostén. Se debe suspender el tratamiento con losartán potásico, hidroclorotiazida y Amlodipina, observar estrechamente al paciente. Las medidas sugeridas incluyen inducir el vómito si la ingestión es reciente, y corregir la deshidratación, el desequilibrio electrolítico, el coma hepático y la hipotensión por los procedimientos establecidos.

PRESENTACION:

Caja conteniendo 30 comprimidos

Venta bajo prescripción médica.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar en lugar fresco y seco, entre 25-30°C



Fabricado por:

Laboratorios ALFA, SRL

República Dominicana
www.laboratoriosalfa.com
Reg. Industrial: 13880